

Notice de médicament

A. Répondez aux questions.

1. Quelle est la forme pharmaceutique utilisée pour ce produit ?
2. À quelles catégories de patients s'adresse-t-il ?
3. Retrouvez dans la notice la justification du producteur concernant l'administration de ce médicament chez les enfants à partir de 15 ans.
4. Quelle est la fréquence d'administration de ce produit ?
5. Quel est l'intervalle minimal à respecter pour répéter la prise de médicament ?

B. Classez les situations médicales suivantes en indications, précautions et contre-indications.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. allergie connue au paracétamol | h. courbature |
| b. douleurs de l'arthrose | i. alcoolisme |
| c. maladies des reins | j. malnutrition |
| d. fièvre | k. traitement avec un autre médicament contenant du paracétamol |
| e. maladie grave du foie | |
| f. maux de tête | |
| g. douleurs dentaires | |

<i>Indications</i>	<i>Précautions</i>	<i>Contre-indications</i>

C. Trouvez les termes scientifiques pour les signes / symptômes suivants:

1. Rougeur cutanée	a. œdème facial
2. Gonflement du visage	b. leucocytes
3. Chute de la pression artérielle	c. érythème cutané
4. Globules blancs	d. hypotension
5. Plaquettes sanguines	e. épistaxis, rhinorrhagie
6. Saignements de nez	f. inflammation
7. Saignements des gencives	g. thrombocytes
8. Éruption cutanée	h. insuffisance rénale
9. Règles douloureuses	i. gingivorragie
10. Maladies graves des reins	j. dysménorrhée
11. Maux de têtes	k. céphalée
12. Gonflement	l. rash cutané

D. Quelle est la conduite que le patient doit adopter dans les situations suivantes :

1. S'il a oublié de prendre son médicament :

.....

2. S'il a pris plus de quantité que prévu :

.....

E. Trouvez des synonymes pour les termes suivants :

1. Antalgique
2. Antipyrétique
3. Courbature musculaire
4. Avis de médecin
5. Malnutrition
6. Déshydratation

F. Calculez la dose maximale journalière de produit nécessaire pour un patient pesant 60 kg et souffrant d'une malnutrition chronique.

G. Complétez les phrases avec l'information qui manque.

1. La durée du traitement est limitée à 5 jours en cas de
2. La durée du traitement est limitée à 3 jours en cas de
3. Les prises systématiques de Doliprane permettent d'éviter les oscillations de
ou de